



เล่มที่
1

รายงานฉบับสมบูรณ์
Final Report

- ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
- การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
- การคัดเลือกอาสาสมัครและการฝึกอบรม

โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูล ความหลากหลาย ทางชีวภาพระดับท้องถิ่น

- กลุ่มป่าหุบเกาะอ่างทอง-อ่าวไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- กลุ่มป่าชุมพร จังหวัดชุมพร
- กลุ่มป่าเขาหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ

2552

ภาคใต้ตอนบน 3 กลุ่มป่า
3 จังหวัด 18 ตำบล



เสนอ

สำนักงานปลัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม



โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



สาธาณกรม

ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น

ตำบลดงขี้ผึ้ง

อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช



โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2552 ในพื้นที่กลุ่มป่าทางฝั่งถนน ศูนย์ อ่างน้ำจืด (ป.) นครศรีธรรมราช



10 ค้างคาวหน้ายักษ์กุ่มภรรยา

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hipposideros pendleburyi* Chasen, 1936

ชื่อวงศ์ HIPPOSIDERIDAE

ชื่อสามัญอังกฤษ Pendlebury Leaf-nosed Bat

ชื่อสามัญไทย ค้างคาวหน้ายักษ์กุ่มภรรยา

ชื่อท้องถิ่น -

ลักษณะ ค้างคาวหน้ายักษ์ขนาดใหญ่ คล้ายกับค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ที่พบได้ทั่วไป แต่มีขนาดเล็กกว่า ความยาวท่อนแขนหน้า 75-80 มิลลิเมตร ขนสีน้ำตาลเทาทั้งตัว ใบหูค่อนข้างเล็ก ปลายหูแหลม แผ่นจมูกหน้าค่อนข้างแคบและเป็นหยักซับซ้อน มีแผ่นจมูกยอยด้านข้างของแกมข้างละ 4 แผ่น แต่แผ่นด้านนอกสุดบางและสั้นมาก ความถี่ของคลื่นเสียงประมาณ 85 กิโลเฮิร์ต

สถานภาพ พบไม่บ่อย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นสัตว์ป่าที่ยังไม่มีการจัดสถานภาพโดย IUCN และจัดว่าเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นไทย

แหล่งที่พบ พบได้ในป่าดิบ หรือในป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ หากินได้เรือนยอดอาศัยเกาะนอนตามถ้ำหินปูน พบได้เฉพาะภาคใต้เท่านั้น





ค้างคาวหน้ายักษ์กุ่มภรรยา

Hipposideros pendleburyi Chasen, 1936





ชื่อวิทยาศาสตร์ *Terpsiphone paradisi* (Linnaeus, 1758)

ชื่อวงศ์ MONARCHIDAE

ชื่อสามัญอังกฤษ Asian Paradise-flycatcher

ชื่อสามัญไทย นกแซวสวรรค์

ชื่อท้องถิ่น -

ลักษณะ นกขนาดเล็ก ความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางประมาณ 21 เซนติเมตร ตัวผู้มีขนหางคู่กลางยื่นยาวมากกว่า 25 เซนติเมตร ท้ายทอยมีหงอนสั้นตั้งเป็นสัน ตัวเต็มวัยปากและวงรอบปากดำสีน้ำตาล ตัวผู้ที่มีภาวะรูปร่างสองแบบ (dimorphism) คือ มีสีขา และสีน้ำตาลแดง ตัวผู้ที่มีสีขา ส่วนใหญ่เป็นสีขา บริเวณหัว พุ่มหงอนขน และคอหอย มีสีดำเป็นมัน ขนปลายปีกและก้านขนปีกสีดำ ตัวผู้ที่เป็นสีน้ำตาลแดง กระหม่อมสีดำ หัวและอกดำบนสีเทาเข้ม ลำตัวด้านบน ปีก และหางสีน้ำตาลแดง ตัวเมียมีลักษณะคล้ายตัวผู้ที่มีขนสีน้ำตาลแดง แต่ขนหางคู่กลางไม่ยื่นยาวออก ตัวผู้ที่เป็นสีน้ำตาลแดงขณะผลัดขนหางคู่กลางออกจะคล้ายตัวเมีย

สถานภาพ นกประจำถิ่น และนกอพยพ พบค่อนข้างบ่อย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และจัดเป็นสัตว์ป่าชนิดที่มีสถานภาพเป็นที่กังวลน้อยที่สุด (Least Concern) ตามการจัดของ IUCN (2009)

แหล่งที่พบ อาศัยตามป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าชายหาด สวนผลไม้ และป่ารุ่น พบตั้งแต่ระดับพื้นราบจนกระทั่งความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล พบทุกภาคทั่วประเทศ





นกแซวสวรรค์

Terpsiphone paradisi (Linnaeus, 1758)



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Phrynoidis aspera* (Gravenhorst, 1829)

ชื่อวงศ์ BUFONIDAE

ชื่อสามัญอังกฤษ River Toad

ชื่อสามัญไทย จิ้งโคร่ง, กง

ชื่อท้องถิ่น -

ลักษณะ คางคกที่มีขนาดใหญ่ ลำตัวป้อม มีสันแข็งบริเวณเหนือตา และแผ่นหู ไม่มีสันแข็งที่ขมับ ต่อมพิษหลังหูมีลักษณะกลม ลำตัวสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม ท้องสีจาง มีจุดประสีเทาดำ

สถานภาพ สถานภาพตามกฎหมายกระทรวง พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จัดเป็น สัตว์ป่าคุ้มครอง และสถานภาพตาม Thailand Red Data และสถานภาพตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) จัดเป็นกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern)

แหล่งที่พบ พบตามลำธารที่มีแก่งหิน และน้ำไหลตลอดทั้งปี ในป่าดิบแล้งถึงป่าดิบชื้นทางภาคตะวันตกจนถึงภาคใต้



จิ้งโคร่ง

Phrynooidis aspera (Gravenhorst, 1829)

